



Användning av koccidiostatika i fjäderfäfoder

1 Användning av koccidiostatika som tillsatts i foder

Koccidiostatika som är godkända inom EU får användas i foder för broilerkycklingar, unghöns (upp till 16 veckors ålder) och kalkoner under de förutsättningar som nämnts i förordningarna om godkännande av tillsatser i foder. För varje koccidiostat har fastställts djurart- eller djurkategorispecifika minimi- eller maximihalter i helfoder (12 % fukthalt) och vid behov en karenstid. Om en högsta resthalt (MLR) fastställts för en koccidiostat, får denna inte överskridas.

Förordningarna om godkännande av tillsatser i foder finns i ett av kommissionen upprätthållet tillsatsregister

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register_en

2 Kompletteringsfoder som innehåller koccidiostatika

Med Livsmedelsverkets tillstånd får man tills vidare fortsättningsvis tillverka industriella kompletteringsfoder för fjäderfä som då kan innehålla högst fem gånger den tillåtna halten koccidiostatika i helfoder för djurarten och djurkategorin i fråga. Då foder som innehåller koccidiostatika används vid utfodring av djur ska karenstiden som fastställts för koccidiostatika följas och anges i märkningarna på förpackningen. Karenstiden ska anges som en minimitid som inte får underskridas, men som kan överskridas.

Användning av industriellt foder som innehåller koccidiostatika på en gård med ett spannmålstillskott innebär i praktiken användning av industriellt foder som innehåller koccidiostatika på gården som kompletteringsfoder. Den näringsmässiga sammansättningen hos kompletteringsfodret som innehåller koccidiostatika bör då vara så planerad att det på gården med ett spannmålstillskott som följer bruksanvisningen för fodret i fråga uppfyller djurets dagliga intag av näring och näringsämnen som helfoder. Dessa industriella kompletteringsfoder bör sålunda innehålla tillräckliga mängder andra näringsämnen såsom proteiner att de inte kan användas på gården som sådana på samma sätt som helfoder, utan de bör blandas med annat foder innan djuren utfodras.

Om fodertillverkarna i bruksanvisningen rekommenderar att man utöver ett industriellt foder för fjäderfä som innehåller koccidiostat också använder inhemsk spannmål så måste minimi- och maximihalten koccidiostat som krävs av fodret med en sådan foderkombination (industriellt foder + spannmål) uppnås kalkylmässigt och anvisningarna om spannmålstillskott anpassas därefter. Fodertillverkaren bör också då han fastställer minimi- och maximimängden spannmålstillskott beakta de normala variationerna i



Enheten för kemisk livsmedelssäkerhet/Fodersektionen

Användning av koccidiostatika i fjäderfäfoder

produktionsprocessen i hans produktionsanläggning för att koccidiostathalten i hela foderransonen med spannmålstillskott ligger inom de gränser som foderförfattningarna fastställt också i det slutliga helfodret som används för utfodring av djuren på gården.

Mer information: rehukyselyt@ruokavirasto.fi