

AFRIKANSKA SVINPESTEN SPRIDER SIG - VAR BEREDD!

Afrikansk svinpest (African Swine Fever, ASF) är en allvarlig viral blödarfebersjukdom som sprids med lätthet bland svin, vildsvin och minisvin. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmedel för ASF-viruset. Afrikansk svinpest smittar inte till människan, men för svin är den dödlig. År 2007 spred sig sjukdomen till Georgien sannolikt med matavfall från ett fartyg som kommit från Afrika. Efter det har ASF spridits bl.a. till Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Serbien, Moldavien, Nordmakedonien, Kosovo, Montenegro, Bosnien och Hercegovina samt EU-länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Kroatien, Grekland och Sverige. Afrikansk svinpest är vitt utbredd i Öst- och Sydostasien och i Afrika. I Kina är sjukdomssituationen mycket hotande. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland.

Spridning

Direkt:

- Från smittade och i sjukdomen avlidna svin och vildsvin till friska svin och vildsvin

Indirekt:

- Via kött, köttprodukter, biprodukter och obehandlade jakttroféer från infekterade svin eller vildsvin.

Importbegränsningarna på grund av afrikansk svinpest ska iaktas vid resor till länder där afrikansk svinpest förekommer.

- Från foder eller matavfall som innehåller infekterat svin- eller vildsvinkött
- **Det är förbjudet att utfodra produktionsdjur med matavfall i EU-länderna.**
- Via redskap, kläder, foder, torströ, transportmedel och livsmedel, som har förorenats av det smittade djurets blod, vävnader eller sekret.

ASF-viruset utsöndras i det insjukade svinets eller vildsvinets alla sekret

Bland annat temperatur, pH, fuktighet och mängden UV-strålning inverkar på virusets överlevnad och smittförande egenskaper.



LIVSMEDELSVERKET
Ruokavirasto • Finnish Food Authority

Viruset överlever i:

- Blod och organ (+4 °C) i 18 mån
- Avföring och urin (+20 °C) i ca 2 veckor, (+4 °C) i flera månader
- Flera månader i kroppen och i biprodukter från döda svin eller vildsvin
- Flera månader och ända upp till ett år i svinkötts- eller vildsvinköttsprodukter som inte har värmebehandlats
- Flera år i djupfryst svin- eller vildsvinkött

Det finns anledning att misstänka ASF, om

- Svinen uppvisar symptom på afrikansk svinpest
- Plötsliga dödsfall eller snabba sjukdomsfall inträffar
- Svinen har en febrig tarmkanals- eller luftvägssjukdom, som en antibiotikakur inte biter på
- Ett dött vildsvin hittas i naturen
- Vildsvinet uppvisade sjukdomssymptom innan det fälldes
- Mer blodighet än normalt observeras vid urtagning av vildsvin

Symptom

- Plötsligt dödsfall utan föregående symptom
- **Hög feber (40,5-42 °C)**, apati
- Huden rodnar, blodutgjutningar på huden
- Aptitlöshet, uppkastningar, (blodig) diarré, förstoppning
- Hälta, styva bakben, ostadig gång, skakningar eller kramp
- Flöde ur ögon och näsborrar
- Kastningar
- Upp till 100 % dödlighet, koma, djuret dör inom 1-7 dygn
- **Antalet insjuknade svin kan variera och symptomen kan också vara mildare**

Symptomen uppstår vanligen inom 3-15 dygn efter att svinet har smittats

Obduktionsfynd

- Blodighet i organen och i hela kroppen
- Blodblandad vätska i bröst- och bukhålan
- Mjälten och lymfkörtlarna är mörka, förstörade och sköra
- Blodutgjutningar i organen och på slemhinnorna i mag-tarmkanalen

Vidta dessa åtgärder om du misstänker ASF

Kontakta utan dröjsmål kommunalveterinären i området.

- Följ kommunalveterinärens anvisningar om rengöring och desinfektion.
- Rengör och tvätta bort all synlig smuts på din utrustning och dina tillbehör.
- Tvätta dina kläder vid högsta tillåtna temperatur enligt tvättrådet.
- Desinficera dem genom att hålla dem i en varm bastu eller i ett torkskåp (minst 60 min +60 °C, observera brandsäkerheten) eller i en lösning med desinfektionsmedel (t.ex. Virkon S 1 % eller hypoklorit 0,5 % lösning minst 30 min). Följ tillverkarens anvisningar.
Desinfektionsmedel kan köpas bl.a. på apotek eller i lantbruksaffärer.
- Tvätta dig och gå i bastu.
- Tvätta och rengör din bil. Även bilens underrede ska rengöras.
- Besök inga svingårdar och delta inte i utfodring av eller jakt på vildsvin inom 48 timmar.

Mer information om afrikansk svinpest:
www.ruokavirasto.fi/asf



LIVSMEDELSVERKET
Ruokavirasto • Finnish Food Authority