

Lintuinfluenssa ja Newcastlen tauti linnuilla



Kuva: Dr. David E. Swayne, USDA



Kuva: Dr. David E. Swayne, USDA



Kuva: AFIP (Armed Forces Institute of Pathology) ja CFSPH (Center for Food Security and Public Health)



Kuva: Dr. Ilaria Caputa, IZSve (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)

Oireet:

- äkillinen kuolleisuuden nousu
- alakuloisuus ja äänettömyys
- syömättömyys
- ripuli
- heltan ja jalkojen turvotus ja sinerrys
- muutokset juomaveden kulutuksessa
- kyyhöttäminen, sulkien pörröttäminen ja pään roikottaminen
- muninnan lasku tai loppuminen, epänormaalit munat
- kouristuksia, halvaantumisia ja muita hermosto-oireita
- hengitystieoireet

Miten toimia:

- ota välittömästi yhteys alueesi kunnaneläinlääkäriin. Mikäli et tavoita kunnaneläinlääkäriä, ota yhteys läänineläinlääkäriin
- kysy toimintaohjeita eläinlääkäriltä

Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi

Kunnaneläinlääkäri, puh:

Läänineläinlääkäri, puh:



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority